

医薬品を正しく購入するための

説 明 文 書

第一類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

| | | |
|---|-----------------------|---|
| 1 | 名称 | マイクロゲン・パスタ |
| 2 | 成分・分量 | 本剤1g中、メチルテストステロン10mg、テストステロンプロピオン酸エステル5mgを含有する親水性クリーム剤(添加物としてステアリルアルコール、プロピレングリコール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ステアリン酸グリセリン、パラベン、ワセリン、コレステロール、感光素301号、香料を含有) |
| 3 | 用法・用量 | 1日1～2回、1回0.1g～0.3gを目的の部位に塗擦する。 |
| 4 | 効能・効果 | 男女両性の無毛症、貧毛症(顔面、胸部、四肢、腋窩、恥部の発毛促進と育毛) |
| 5 | 保健衛生上の危害を防止するために必要な事項 | <p>1、次の人は使用しないこと 前立腺腫瘍(悪性)のある人、妊婦、妊娠している可能性のある女性、授乳中の人、小児(15歳未満)、排尿困難を伴う前立腺肥大のある人、睡眠時無呼吸症候群である人、円形脱毛症の人</p> <p>2、用法・用量については次のことに注意してください。 (1)1日1～2回、まゆ毛には1回0.1gくらい(小豆粒くらい)を、ヒゲ・胸毛、体毛などには0.1～0.3gくらいを塗擦する。使いすぎないようにご注意ください。即効性ではなく、一般的には1ヶ月から2～3ヶ月くらいの連続使用が必要とされていますが、効果には個人差があるので、1～2ヶ月続けて使用しても反応が認められないような場合にはそれ以上のご使用はおすすめできません。 (2)目に入らないよう注意してください。万一目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。 (3)塗布部を清潔にしてからお使いください。 (4)ご使用前後は石鹸とぬるま湯で手指を十分に洗って下さい。本剤を使用者以外の人に付着させないように注意して下さい。付着した場合は直ちに洗い流して下さい。</p> <p>3、次の部位には使用しないこと 目や目の周囲、粘膜(口腔、鼻腔等)、頭髮、マツ毛、陰茎部先端(尿道口)、恥部の粘膜部、外傷、炎症、湿疹、ただれ、化膿などのある部位</p> <p>4、次に該当する人はお申し出ください 医師の治療を受けている人、前立腺肥大症ではあるが、排尿困難を伴わない人、薬や化粧品等によるアレルギー症状を起こしたことがある人、本人又は家族がアレルギー体質の人、重度の心臓病、腎臓病、肝臓病、高血圧又はその既往歴のある人</p> |
| 6 | 薬剤師が必要と判断する事項 | |

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師にご相談下さい。