

塗抹即可有效促進臉部及身體的〈毛〉生育的育毛膏

MICROGEN PASTAE

第1類醫藥品

MICROGEN PASTAE

MICROGEN PASTAE 是以二種睪丸素（男性荷爾蒙）為主要成分，易吸收的膏狀外用育毛劑，塗抹即可有效促進眉毛、鬍鬚、胸毛、腋毛、陰毛等除頭髮以外之部分應生長的硬毛生育。

不可用於頭髮



使用注意事項



禁止事項

(若不遵守，將有可能導致現在的症狀惡化，或容易發生副作用、事故)

1. 下列人士不可使用
 - (1) 曾對本產品成分發生過敏症狀的人
 - (2) 使用前從罐中擠出 5mm 左右的本產品，塗抹在大腿內側等皮膚較薄的部位後，在翌日出現藥疹、泛紅、瘙癢、炎症、紅腫等症狀的人
 - (3) 有雄激素依賴性腫瘤（例如前列腺腫瘤、乳癌（惡性））的人及疑似罹患的人
 - (4) 孕婦、有懷孕可能性的女性、哺乳期的人
 - (5) 兒童（未滿 15 歲）
 - (6) 伴隨排尿困難症狀的前列腺肥大的人
 - (7) 前列腺檢查※結果顯示前列腺特異抗原(PSA)數值為 2.0ng/mL 以上的人（遵守醫生判斷）
 - ※本產品的有效成分（甲基睪丸素、丙醯睪丸素）恐會促進前列腺腫瘤生長。
 - a) 尤其是 50 歲以上男性，前列腺腫瘤的罹病率增加，因此在使用本產品前必須做前列腺檢查。
 - b) 持續使用的人必須定期做檢查。
 - c) 若檢查結果異常，請立刻停用本產品，並即時諮詢醫生或藥劑師
 - (8) 睡眠呼吸中止症患者
 - (9) 圓禿患者
2. 不可用於下列部位
 - (1) 眼睛及眼睛周圍、黏膜（口腔、鼻腔等）
 - (2) 頭髮、睫毛
 - (3) 陰莖部前端（尿道口）、陰部黏膜處
 - (4) 外傷、炎症、濕疹、糜爛、化膿等部位
3. 使用本產品期間，請勿同時使用其他含有男性荷爾蒙的任何醫藥品
4. 非使用者請勿接觸本產品
 - (1) 使用後請用肥皂及溫水徹底清潔雙手。
 - (2) 非本產品使用者請勿接觸本產品。若不慎接觸，請立即清洗沖淨。
 - (3) 塗抹部位有可能接觸到他人時，請用肥皂及溫水測底清洗塗抹部位。



諮詢

1. 下列人士請在使用前諮詢醫生或藥劑師
 - (1) 正在接受醫生治療的人
 - (2) 有前列腺肥大症，但無排尿困難的人
 - (3) 曾對藥物及彩妝保養品等出現過敏症狀（出疹、泛紅、瘙癢、炎症、紅腫等）的人
 - (4) 本人或家人是過敏體質的人
 - (5) 重度心臟病、腎臟病、肝臟病、高血壓患者或有上述病史的人
2. 若出現下列情況，請立刻停止使用，並攜帶本說明書諮詢醫生或藥劑師
 - (1) 使用後出現下列症狀

相關部位	症 狀
皮 膚（塗抹部位）	出疹、泛紅、紅腫、炎症、瘙癢、水泡、瘡瘡

- (2) 使用 1~3 個月後，症狀仍不見改善
- (3) 月經異常或出現變聲等男性化跡象
- (4) 使用方法錯誤

功效

男女兩性的無毛症、少毛症
(促進面部、胸部、四肢、腋下、陰部的毛髮生長及育毛)

用法、用量

1天1~2次、1次0.1g~0.3g 塗抹於患部。

詳細使用方法

打開罐蓋，用凸起部位打開罐口，根據塗抹面積大小，依照下列劑量適量塗抹。

- ◆ 眉毛：約1次0.1g(紅豆大小)，1天1~2次，從眉頭往眉尾輕輕塗抹。
- ◆ 體毛(陰毛)的無毛或少毛：1次0.1g~0.3g，1天1~2次，避開黏膜部位，往下腹部塗抹。
- ◆ 鬍鬚、胸毛等：根據塗抹部位的面積大小，1次0.1g~0.3g，用指尖充分抹開塗擦，1天1~2次。
- ◆ 請勿使用過量。

用法、用量相關注意事項

- (1) 請嚴格遵守本產品的規定用法、用量。
- (2) 請小心不要讓本產品進入眼睛。萬一不慎進入眼睛，請立刻用清水或溫水清洗。此外，若症狀嚴重，請即時至眼科就診。
- (3) 使用前後，請徹底清潔手指。
- (4) 請在清潔患部後再使用本產品。
- (5) 本產品僅限外用。
- (6) MICROGEN PASTAE 沒有速效性，一般必須連續使用1個月到2~3個月左右才能見效。可是，效果會有個人差異，因此若在連續使用1~2個月仍未出現期待的效果，不建議繼續使用。
- (7) 高齡人士(65歲以上)使用，有可能無法得到期待的效果。
- (8) 本產品並無將白色毛髮變成黑色毛髮的效果。

成分、劑量

本產品1g中

有效成分	含量
甲基羥丸素	10mg
丙醯羥丸素	5mg

含有添加物：硬脂醇、丙二醇、聚氧乙烯氫化蓖麻油、單硬脂酸甘油酯、對羥基苯甲酸酯、凡士林、膽固醇、感光素301號、香料。

保管及使用注意事項

- (1) 避開陽光直射，盡量於濕度較低的陰涼處密封保管。
- (2) 請置於兒童碰不到的地方。
- (3) 請勿換裝至其他容器中。(會導致誤用或品質改變)
- (4) 請勿使用過期產品。
- (5) 若擠出過量，請勿再裝回罐內。
- (6) 若難以從罐中擠出本產品，請用手掌等溫熱1~2分鐘。

包裝：6g、12g、30g(30g的量適用於體毛)

全國藥局、藥妝店及百貨公司藥品部皆有販售。

．．．諮詢窗口．．．

啟芳堂製藥株式會社 顧客諮詢室

☎03-3828-5663

受理時間 9:00~17:00 (週六、週日、節假日除外)

—製造銷售商—

啟芳堂製藥株式會社

東京都文京區千駄木 1-22-3

☎03-3821-0085(代表號)